

Acyclovir (Ophthalmic)

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥用於皰疹病毒引起的眼睛感染。

二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 在使用該藥期間，請勿佩戴隱形眼鏡。
2. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。



懷孕請告訴醫師

三. 副作用為何？

1. 刺痛。
2. 眼睛刺激。
3. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 一旦想起應儘早敷上錯過的藥劑。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 請勿在同一時間使用 2 次劑量或額外劑量。



Acyclovir (Ophthalmic)

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。
3. 扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥劑師諮詢。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate



T-C-0210-ED-051-04

2

