

Brimonidine (Ophthalmic)

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥用於降低高眼壓。
2. 此藥用於治療青光眼。
3. 有些藥物用來治療眼睛泛紅。



二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動，直到您發現該藥的影響。
2. 遵照醫師指示接受眼壓和視力檢查。
3. 在飲酒或服用其他會造成您行動遲緩的藥物和天然滋補品前，請告知您的醫師。
4. 若您有眼睛受感染、受傷或將接受眼睛手術的情形，請告知醫生。
5. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。



Brimonidine (Ophthalmic)

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：灼痛或刺痛、視力模糊、感覺眼中有異物、口乾、頭痛、感覺疲倦或虛弱、嗜睡。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 一旦想起應儘早服用錯過的藥物。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 請勿在同一時間使用 2 次劑量或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。
3. 扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥劑師諮詢。

