

Atropine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 它是在檢查眼睛或動眼睛手術前擴張瞳孔用的。
2. 此藥用於治療眼睛炎症。
3. 此藥用於治療弱視。

二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 所有眼用製劑：

- a. 瞳孔擴張時，應避免駕駛及從事必須以清楚視力進行之活動。
- b. 使用此藥後一段時間內，強光可能引起不適。在醫師指示的期間內佩戴太陽鏡。



- c. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。



2. 滴眼液：

- a. 勿讓3個月以下幼兒服用此藥。



三. 此藥物的其他副作用為何？

1. 可能包括：視力模糊、刺痛、眼睛刺激。
2. 嘴唇、皮膚或眼睛發乾。
3. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。



1

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-054-04



天成醫療體系 中壢 天晟醫院 楊梅 天成醫院 關心您



Atropine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 一旦想起應儘早服用錯過的藥物。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 請勿在同一時間使用 2 次劑量或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 防止藥物受熱。
3. 鎖緊上蓋。
4. 扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥劑師諮詢。

