

Tropicamide

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 該藥用於眼科檢查之前。



二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 瞳孔擴張時，應避免駕駛及從事必須以清楚視力進行之活動。
2. 使用此藥後一段時間內，強光可能引起不適。在醫師指示的期間內佩戴太陽鏡。
3. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。您將必須討論在懷孕期間使用此藥對您帶來的益處與風險。
4. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。您將必須討論對嬰兒造成的風險。



懷孕請告訴醫師

三. 此藥物的其他副作用為何？

1. 可能包括：刺痛、眼睛刺激、視力模糊、口乾、頭痛、噁心或嘔吐。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。



Tropicamide

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 一旦想起應儘早服用錯過的藥物。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 請勿在同一時間使用 2 次劑量或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 防止藥物受熱。
3. 鎖緊上蓋。
4. 扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥劑師諮詢。

