

Carteolol (Ophthalmic)

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥用於治療青光眼。
2. 此藥用於降低高眼壓。



二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 開車或需要有清楚視力的工作時，要小心使用。
2. 遵照醫師指示接受眼壓和視力檢查。
3. 若您有眼睛受感染、受傷或將接受眼睛手術的情形，請告知醫生。
4. 此藥可能會隱藏低血糖症狀。請與醫師洽談。
5. 若您患糖尿病，將需密切觀察您的血糖變化。
6. 此藥物讓您難以判別是否出現甲狀腺功能亢進的症狀，如心動過速。若您有甲狀腺亢進的問題卻突然停藥，病情可能會加劇、甚至可能危及生命請洽詢醫師建議。
7. 若是您接觸過敏源，有可能引發更加嚴重的反應。若您使用epinephrine(腎上腺素)來治療嚴重的過敏反應，請和醫師洽談。當您正在使用此藥時，epinephrine可能無法充分發揮藥效。
8. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。



1

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-058-04



Carteolol (Ophthalmic)

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 眼睛刺激、燒灼感、更多淚水、頭痛、眩暈、入睡困難、鼻竇刺激、味覺能力的改變。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 一旦想起應儘早服用錯過的藥物。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 請勿在同一時間使用 2 次劑量或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 將打開的瓶子立放儲存在室溫下。
2. 避光，鎖緊上蓋。
3. 儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
4. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。
5. 扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥劑師諮詢。

