

Brimonidine and Timolol

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥用於治療青光眼。
2. 此藥用於降低高眼壓。



二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動，直到您發現該藥的影響。
2. 此藥可能會隱藏低血糖症狀。請與醫師洽談。
3. 遵照醫師指示接受眼壓和視力檢查。
4. 若您有眼睛受感染、受傷或將接受眼睛手術的情形，請告知醫生。
5. 在飲酒或服用其他會造成您行動遲緩的藥物和天然滋補品前，請告知您的醫師。
6. 氣喘病患中，曾經發生嚴重且有時致命的呼吸問題。請洽詢您的醫師。
7. 已有接受此藥後出現重度有時甚至致命性心臟問題(例如，心臟衰竭)的病例發生。請與醫師商洽相關事項。
8. 若是您接觸過敏源，有可能引發更加嚴重的反應。若您使用epinephrine(腎上腺素)來治療嚴重的過敏反應，請和醫師洽談。當您正在使用此藥時，epinephrine可能無法充分發揮藥效。



Brimonidine and Timolol

製定日期：102年9月11日

修定日期：109年7月1日(第4版)

9. 此藥物讓您難以判別是否出現甲狀腺功能亢進的症狀，如心動過速。若您有甲狀腺亢進的問題卻突然停藥，病情可能會加劇、甚至可能危及生命請。
10. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險



懷孕請告訴醫師

三. 副作用為何？

1. 眼睛刺激、瘙癢、燒灼感、刺痛、嗜睡。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 一旦想起應儘早服用錯過的藥物。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 請勿在同一時間使用 2 次劑量或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 避光，儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-059-04

