

# Travoprost and Timolol

製定日期：102年9月11日  
修定日期：109年7月1日(第4版)

## 一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥用於治療青光眼。
2. 此藥用於降低高眼壓。



## 二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動，直到您發現該藥的影響。
2. 此藥可能會隱藏低血糖症狀。請與醫師洽談。
3. 遵照醫師指示接受眼壓和視力檢查。
4. 若您有眼睛受感染、受傷或將接受眼睛手術的情形，請告知醫生。
5. 強光可能引起不適。戴太陽眼鏡。
6. 在飲酒或服用其他會造成您行動遲緩的藥物和天然滋補品前，請告知您的醫師。
7. 已有接受此藥後出現重度有時甚至致命性心臟問題（例如，心臟衰竭）的病例發生。請與醫師商洽相關事項。
8. 曾有人在接受此藥後出現重度有時甚至致命的呼吸疾患。請洽詢您的醫師。
9. 此藥物讓您難以判別是否出現甲狀腺功能亢進的症狀，如心動過速。若您有甲狀腺亢進的問題卻突然停藥，病情可能會加劇、甚至可能危及生命請洽詢醫師建議。



1

Last Reviewed Date  
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-062-04



# Travoprost and Timolol

製定日期：102年9月11日  
修定日期：109年7月1日(第4版)

10. 若您曾經出現嚴重的過敏反應，請告知您的醫師。若是您接觸過敏源，有可能引發更加嚴重的反應。若您使用 epinephrine（腎上腺素）來治療嚴重的過敏反應，請和醫師洽談。當您正在使用此藥時，epinephrine（腎上腺素）可能無法充分發揮藥效。
11. 如果您在懷孕時服用此藥物，可能會傷害腹中胎兒。若在服用此藥期間您懷孕或試圖懷孕，應立即致電醫師商洽。
12. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。將必須討論嬰兒的風險。



懷孕請告訴醫師

## 三. 副作用為何？

1. 眼睛刺激、燒灼感、刺痛、感覺眼中有異物、眼睛乾澀、淚溢、眼睛泛紅、頭痛、眼瞼膚色變深、眼瞼腫脹、眼瞼結痂、加重口渴、咳嗽、咽喉刺激、眩暈、感覺緊張、容易興奮、感覺疲倦或虛弱、鼻子疼痛。
2. 此藥可能造成睫毛變化，像是睫毛的顏色加深、變粗或變濃密。這些變化通常會在停藥後恢復正常。
3. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。



# Travoprost and Timolol

製定日期：102年9月11日  
修定日期：109年7月1日(第4版)

## 四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 跳過未服的藥物，繼續按照您的療程服藥。
2. 請勿在同一時間使用 2 次劑量或額外劑量。

## 五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 鎖緊上蓋。
3. 開封後達 120 天後，將任何未用完的藥物丟棄。
4. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

