

Norfloxacin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥用於治療細菌感染。

二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動，直到您發現該藥的影響。
2. 若您患有蠶豆症（G6PD 缺乏症）(G6PD deficiency)，請小心。可能引起貧血。
3. 可能會發生嚴重的皮膚反應（史帝文生-強生症候群 (Stevens-Johnson Syndrome)/毒性表皮壞死症 (toxic epidermal necrolysis)）。可能會造成不會消退的嚴重健康問題，有時甚至致命。若您有如皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮（無論有無發燒）；眼睛發紅或刺激；嘴部、喉嚨、鼻子或眼睛出現潰瘍等症狀，請立即尋求醫療協助。
4. 若您的年紀已逾 60 歲，使用此藥時須小心。您可能會有較多的副作用。
5. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。
6. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。您將必須討論對嬰兒造成的風險。



1

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-067-04



Norfloxacin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 此藥物的其他副作用為何？

1. 所有藥物皆可能引起副作用。但有許多人沒有副作用，或是只有輕微的副作用。假如任何一項副作用或其他任何副作用令您困擾或是不會消退，請致電您的醫師或接受醫療協助，包括：頭痛、眩暈、噁心或嘔吐、腹瀉、便秘、無饑餓感、嗜睡。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 跳過未服的藥物，繼續按照您的療程服藥。
2. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 鎖緊上蓋。
3. 避光。
4. 儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
5. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。
6. 扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥劑師諮詢。

