

Prednisolone (Ophthalmic)

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥用於治療眼睛炎症。



二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 開車或做其他需要有清楚視力工作時，要小心使用。
2. 長期使用此藥可能增大罹患白內障或青光眼的風險。請與醫師商洽相關事項。
3. 若您使用此藥已有較長時間，請進行眼壓檢查。請告知您的醫師。
4. 請勿超過醫師告知您的藥物使用時長。
5. 若您對亞硫酸鹽過敏，請洽詢醫師。某些藥品的確含有亞硫酸鹽。
6. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。



懷孕請告訴醫師

三. 副作用為何？

1. 可能包括：味覺能力的改變、感覺眼中有異物、頭痛、燒灼感、刺痛、眼睛刺激。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。



1

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-069-04



Prednisolone (Ophthalmic)

製定日期：102年9月11日

修定日期：109年7月1日(第4版)

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 一旦想起應儘早服用錯過的藥物。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 請勿在同一時間使用 2 次劑量或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。請勿冷凍儲存。
2. 鎖緊上蓋。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。
4. 扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥劑師諮詢。

