

Amorolfine solution (Amocoat Nail Lacquer)



製定日期：102年9月11日

修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 什麼是灰指甲？

1. 灰指甲就甲黴菌病(Onychomycosis)，也就是一般俗稱的臭甲；是由黴菌感染引起的一種指(趾)甲疾病；其中85~90%是由皮癬菌(Dermatophytes)感染引起，約有5%的病例是由非皮癬菌(Non-Dennatophyte Moulds)引起，另外約有5%混合性的同時感染。
2. 灰指甲一般初期會由指甲的尖端外側開始變厚、變黃、變黑、變灰，逐漸蔓延至整個指甲，造成指甲表面粗糙失去光澤、龜裂、破碎，甚至變形或與甲床分離；臨床顯示腳趾甲的感染率遠高於手指甲，且長期有香港腳、皮膚黴菌感染、糖尿病的患者有極高比例會同時感染灰指甲。

二. 灰指甲的種類：依其患部位置可分為五種類型：

 <p>感染途徑</p> <p>a. 遠端甲下型灰指甲 b. 外側甲下型灰指甲</p>	 <p>感染途徑</p> <p>c. 淺表型白灰指甲 e. 全部營養不良型灰指甲</p>
 <p>感染途徑</p> <p>c. 淺表型白灰指甲</p>	<p>其中a、b、c屬病情較輕的非甲母質侵犯型灰指甲；而d、e則屬病情較重的甲母質侵犯型灰指甲。</p> <p>*本文僅供醫療人員衛教使用。</p>
 <p>感染途徑</p> <p>d. 近端甲下型灰指甲</p>	 <p>1</p>

T-C-0210-ED-242-04



Amorolfine solution (Amocoat Nail Lacquer)


製定日期：102年9月11日

修定日期：109年7月1日(第4版)


三. 使用說明

1. 銼甲：使用指甲剪將感染部位的指甲**儘量剪除**，再用指甲銼刀將指甲面儘量磨平。
2. 消毒清潔：以酒精棉充分清潔擦拭磨平後之受感染的趾(指)甲表面。
3. 引流取藥：將藥瓶斜放，紅色箭頭轉向上面，給藥板置於瓶口上，調整瓶身角度讓藥液停於瓶口並用給藥板沾取藥液，每次取藥約為0.02~0.03ml。
4. 塗藥：立即均勻塗抹藥液至受感染的指甲面及指甲周圍溝縫。用藥後**8個小時**內請勿洗澡或淋浴。
5. 旋緊瓶蓋：使用後請立刻關緊以免油劑揮發乾掉。
6. 待乾：**3~5分鐘後溶劑會揮發掉形成無色防水的多孔性塑化扁膜**。
7. 清除殘留：用酒精棉清除藥板上殘留藥液，可重覆使用至小孔堵塞後才更換另一支新給藥板使用。


每週使用1-2次，每次使用完畢請清潔瓶口並立即關緊藥瓶，以免油劑揮發乾掉




銼甲



消毒清潔




引流取藥




塗藥



旋緊瓶蓋



待乾



清除殘留



T-C-0210-ED-242-04

