

Bisacodyl

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥用於治療便秘。
2. 此藥用作輕瀉劑，清洗大腸以接受檢查。

二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 除非有醫師的指示，否則請勿使用該藥超過1週。
2. 除非醫師另外指示，否則請勿使用其他瀉劑或軟便劑。
3. 若服用此藥後，出現直腸出血或未排便的情形，請告知您的醫師。
4. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。
您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。
5. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。
您將必須討論對嬰兒造成的風險。



懷孕請告訴醫師



三. 副作用為何？

1. 可能包括：腹痛、胃痙攣、燒灼感。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。



Bisacodyl

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 假如您定期服用此藥物，錯過服用時請在想起時立即服用。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。
4. 該藥可使用數次，需要時即可使用。服用次數勿超過醫師囑咐的次數。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。
4. 扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥劑師諮詢。

