

Terbutaline


製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥協助肺病患者張開氣道以防痙攣引起呼吸問題。

二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 若您的正常劑量藥效不佳、您的症狀惡化，或使用的次數必須超出正常次數，請聯絡您的醫師。
2. 在使用任何其他藥物或吸入型藥物前，請告知您的醫師。
3. 若您有糖尿病，請洽詢醫師。
此藥可能增高血糖。
4. 請遵照醫師指示檢查您的血糖。
5. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。
4. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。您將必須討論對嬰兒造成的風險。



三. 副作用為何？

1. 可能包括：感覺緊張、容易興奮、顫抖、心神不定、頭痛。
2. 這些未涵蓋所有的副作用。



1

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-205-04



Terbutaline

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 假如您定期使用此藥物，一旦錯過使用，請在想起時立即使用。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 請勿在同一時間使用 2 次劑量或額外劑量。
4. 此藥通常僅在需要時才使用。使用次數勿超過醫師囑咐的次數。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

