

Clobetasol

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？


1. 此藥的作用是治療皮膚刺激
2. 此藥用於治療皮疹。
3. 此藥用於治療頭皮牛皮癬。
4. 此藥用於治療斑塊型（斑狀）乾癬。



二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 所有劑型：

- a. 在皮膚上使用其他藥物或產品前，請告知您的醫師。
- b. 勿塗抹於割傷處、擦傷處或受損的皮膚。
- c. 請勿超過醫師告知您的藥物使用時長。
- d. 服用此藥可能增加罹患白內障或青光眼的機率。
- e. 在某些案例中，此藥會影響兒童和青少年的成長發育。可能需要定期檢查他們的成長發育狀況。
- f. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。



三. 副作用為何？

1. 警告/小心：即便極為罕見，有些人服用藥物時可能會有極為嚴重或甚至致死的副作用。若您出現下列可能與極嚴重副作用相關的任何徵兆或症狀，請立即告知您的醫師或接受醫療協助：
 - a. 過敏反應的症狀有皮疹；蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨發燒；喘鳴；胸口或喉嚨緊繃；難以呼吸、吞嚥或說話困難；嗓音異常嘶啞；或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。



1



Clobetasol

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

- b. 高血糖的症狀有意識惑亂、嗜睡、口渴感增強、飢餓、頻尿、潮紅、呼吸急促或呼吸中帶有水果氣味。
- c. 庫興氏病的症狀，如上背部或腹腔處的體重增加、月亮臉、重度頭痛或傷口癒合緩慢。
- d. 腎上腺機能低下的症狀，如嚴重胃部不適或嘔吐、嚴重頭昏或昏厥、肌肉無力、感覺非常疲倦、情緒改變、沒有飢餓感或體重減輕。
- e. 皮膚出現改變（青春痘、妊娠紋、傷口癒合緩慢、長毛）。
- f. 用藥處感到刺激。
- g. 皮膚變薄。
- h. 視力改變、眼睛疼痛或嚴重眼睛刺激。

四. 我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 一旦想起應儘快補上錯過的藥劑。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次塗抹兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 所有劑型：
 - a. 存放於室溫下。請勿冷存或冷凍。
 - b. 務必確保您知道在必須丟棄此藥之前，您能存放此藥多久。
 - c. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。
 - d. 扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥劑師諮詢。

