



Ipratropium and Albuterol

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥協助肺病患者張開氣道以防痙攣引起呼吸問題。

二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動，直到您發現該藥的影響。
2. 請勿超過指示的使用劑量與次數。曾有人因過量使用此藥而死亡。請向您的醫師洽詢。
3. 若您的正常劑量藥效不佳、您的症狀惡化，或使用的次數必須超出正常次數，請聯絡您的醫師。
4. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。
5. 若您患高血糖（糖尿病），將需密切觀察您的血糖變化。
6. 請勿讓此藥進入眼睛。
7. 如果此藥進入眼睛，立即用水沖洗。如果藥物進入眼睛以及出現視力模糊、青光眼惡化或眼睛疼痛，請立即聯絡醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-207-04



Ipratropium and Albuterol

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：感覺緊張、容易興奮、頭痛、顫抖。
2. 這些未涵蓋所有的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 假如您定期使用此藥物，一旦錯過使用，請在想起時立即使用。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 請勿在同一時間使用 2 次劑量或額外劑量。
4. 此藥通常僅在需要時才使用。使用次數勿超過醫師囑咐的次數。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。請勿冷凍儲存。
2. 避光。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。
4. 將未使用的容器保存在鋁箔袋中直到用時。

