

Diflucortolone


製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥的作用是治療皮膚刺激。
2. 此藥用於治療皮疹。

二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 在大片皮膚上塗抹或有裸露傷口時，請務必特別小心。請告知醫師。
2. 請勿超過醫師告知您的藥物使用時長。
3. 此藥可能會提高感染風險。若您出現感染症狀，例如發燒、發冷、喉嚨痛、皮膚發紅或腫脹，請立即致電聯絡醫師。
4. 若你是 65 歲或 65 歲以上，使用此藥時要小心。你可能會會有較多的副作用。
5. 在某些案例中，此藥會影響兒童和青少年的成長發育。可能需要定期檢查他們的成長發育狀況。
6. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。
7. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。您將必須討論對嬰兒造成的風險。



Diflucortolone

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 警告/小心：即便極為罕見，有些人服用藥物時可能會有極為嚴重或甚至致死的副作用。若您出現下列可能與極嚴重副作用相關的任何徵兆或症狀，請立即告知您的醫師或接受醫療協助

- a. 過敏反應的症狀有皮疹；蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨發燒；喘鳴；胸口或喉嚨緊繃；難以呼吸、吞嚥或說話困難；嗓音異常嘶啞；或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
- b. 高血糖的症狀有意識惑亂、嗜睡、口渴感增強、飢餓、頻尿、潮紅、呼吸急促或呼吸中帶有水果氣味。
- c. 皮膚出現改變（青春痘、妊娠紋、傷口癒合緩慢、長毛）。
- d. 嚴重皮膚刺激。
- e. 骨骼疼痛。
- f. 皮膚乾燥。
- g. 視力改變、眼睛疼痛或嚴重眼睛刺激。
- h. 掉頭髮。
- i. 圓臉。
- j. 嚴重頭痛。
- k. 嚴重噁心或嘔吐。
- l. 皮膚皺紋。
- m. 更細緻或柔滑的皮膚。
- n. 皮膚顏色改變。
- o. 體重顯著增加。



Difflocortolone

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 一旦想起應儘快補上錯過的藥劑。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次塗抹兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。請勿冷凍儲存。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。
3. 扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥劑師諮詢。

