

Salicylic acid and Lactic acid (Duofilm Solution)

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 適應症：

1. 除疣劑，疣乃由人類乳突狀瘤病毒感染而引起的表皮組織不正常角化反應。
2. 其潛伏期可長達數週至數月，並可經由接觸受損肌膚傳染，尤其在潮濕及溫暖的環境下更易傳染。




手部尋常疣



足蹠疣

二. 用法用量：

1. 此藥含有水楊酸及乳酸成份，其作用係以其角質溶解作用，除去被疣濾過性病毒所感染之上皮細胞。
2. 先將患部浸泡於熱水中至少5分鐘，並用浮石或銼刀輕輕磨去多餘角質，然後用乾毛巾擦乾。
3. 每天一次，使用藥瓶中所附的刷子，將2~4滴藥水擦在患部上，不可讓藥水觸及正常的皮膚。
4. 塗抹第1滴後，需待患部完全乾後，再塗抹第2滴。
5. 等藥水乾涸後可用OK繃將患部封起來，以增加藥水的穿透力。



1



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-243-04



Salicylic acid and Lactic acid (Duofilm Solution)

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 注意事項：

1. **糖尿病及血液循環障礙患者請勿使用。**
2. 黑痣、胎記不適用本品。
3. 只可以外用，不可觸及眼睛、臉部、生殖器或黏膜部位，以及痣周圍的正常皮膚。若不小心誤觸，請立刻用**清水沖洗15分鐘**，並儘快尋求醫師協助處理。
4. 本品有**可燃性**，**放置的地方需遠離火源**，不使用時請將瓶蓋旋緊。

