

FentaNYL Transdermal patch

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

1



剪開

- 從密封包裝內取出貼片劑。
- 取出後需立即使用。

2



撕開

- 先將貼片保護層移除。

3



張貼

- 貼上皮膚並用**手掌用力緊壓30秒**，確保整片貼片完全與皮膚接觸。
- 注意角落部位應緊密黏貼，避免碰到貼片的黏著層，貼上後以清水洗手。



1

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-211-04



FentaNYL Transdermal patch

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 使用前準備：

1. 於**上軀幹或上臂**找一塊**無刺激及無放射線照射的平整皮膚表面**。對於年紀較小的兒童而言，上背部為較理想的部位，因兒童挪移貼片的可能性最低。
2. 使用貼片前，要將貼藥部位(最好是無毛髮生長的區域)的毛髮剪除(勿用刮除方式剃除)。
3. 如於使用貼片，欲清潔穿皮貼片劑投與部位的皮膚，用清水潔淨即可。**不能使用肥皂、油乳液或任一其它會刺激皮膚或改變膚質的物質**。
4. 貼上貼片之前，應使皮膚完全乾燥。

二. 使用後處置：

1. 使用過的穿皮貼片劑，**應對黏後放入原包裝袋，繳回(醫院)藥局銷毀**。
2. 如有未曾使用剩下之貼片應退還(醫院)藥局。
3. 貼上貼片後或移除貼片後只能**用水洗手**。
4. 穿皮貼片劑無論使用前後，均應放置於兒童無法觸及處。
5. 穿皮貼片劑**不能分割/切開或以任何方式破壞**，因為這可能會破壞Fentanyl的緩釋劑型。
6. Fentanyl穿皮貼片劑可連續貼足72小時。新的貼片要貼在與前一片不同的位置。同一部位的皮膚必須相隔數日才可再貼上一片新貼片。



T-C-0210-ED-211-04

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate



Fentanyl

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥用於減輕疼痛。

二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 長期或定期使用類鴉片藥物，可能會導致藥物依賴性。突然降低劑量或停用此藥可能會增高藥物戒斷或出現其他嚴重問題的風險。若您疼痛加劇、情緒改變、有自殺的想法或任何其他不良反應，請告知您的醫師。
2. 請勿服用超過醫師指示的劑量。服用過量劑量可能會提高出現嚴重副作用的機率。
3. 在與您的醫生溝通之前，請勿將此藥物與其他強烈止痛藥物一起服用。
4. 若您時常喝葡萄柚汁或吃葡萄柚，請告知您的醫師。
5. 此藥會提高部分病患癲癇發作的機率，包括過去曾癲癇發作的病患。
6. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
7. 為降低頭暈或昏厥的機率，若您已坐下或躺下一段時間，應非常緩慢地站起。上下樓梯時請小心。



Fentanyl

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項？

8. 長期使用類鴉片藥物可能會導致性荷爾蒙降低。如果您的性慾降低、有生育問題、無月經（女性）或性能力改變（男性），請致電聯絡您的醫師。
9. 如果您在懷孕時服用此藥物，可能會傷害腹中胎兒。

三. 副作用為何？

1. 可能包括：感覺頭暈、想睡、疲倦或虛弱、口乾、便秘、腹瀉、胃痛、胃部不適、嘔吐或飢餓感降低、頭痛、感覺冷、入睡困難、出汗過多。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 在拿掉舊藥貼布後，一旦想起應儘快敷上錯過的藥貼布。
2. 請勿使用雙倍劑量或過量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。請勿冷凍儲存。
2. 取下皮膚藥貼布後，確保相互摺疊其黏性側。將用過的藥貼布扔到兒童無法與其接觸之處。

