

Doxepin (Topical)

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥用於治療發癢。
2. 此藥可能因其他原因而給您服用。

二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
2. 在飲酒或服用其他會造成您行動遲緩的藥物和天然滋補品前，請告知您的醫師。
3. 塗抹於大面積的皮膚上時，請格外小心。
4. 若你是 65 歲或 65 歲以上，使用此藥時要小心。您可能會有較多的副作用。
5. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。



避免飲酒或喝含酒精飲料



懷孕請告訴醫師

三. 副作用為何？

1. 過敏反應的症狀有皮疹、蕁麻疹、發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨發燒；喘鳴；胸口或喉嚨緊繃；難以呼吸、吞嚥或說話困難；嗓音異常嘶啞；或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。



Doxepin (Topical)

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

2. 其它包括：非常想睡、感到困惑、嚴重皮膚刺激。
3. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 一旦想起應儘快補上錯過的藥劑。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 勿塗抹兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。
3. 扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥劑師諮詢。

