

Triamcinolone (Topical)

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 口腔糊劑：

- a. 該藥用於口腔刺激的治療。

二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 所有劑型：

- a. 請勿超過醫師告知您的藥物使用時長。
- b. 在皮膚上使用其他藥物或產品前，請告知您的醫師。
- c. 在大片皮膚上塗抹或有裸露傷口時，請務必特別小心。
- d. 用於兒童時須小心。請與醫師商洽相關事項。
- e. 在某些案例中，此藥會影響兒童和青少年的成長發育。可能需要定期檢查他們的成長發育狀況。請和醫師討論。
- f. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。



三. 副作用為何？

1. 所有劑型：

- a. 過敏反應的症狀有蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，可能伴隨發燒；喘鳴；胸口或喉嚨緊繃；難以呼吸、吞嚥說話困難；嗓音嘶啞；或臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
- b. 高血糖的症狀有意識惑亂、嗜睡、口渴感增強、飢餓、頻尿、潮紅、呼吸急促或呼吸中帶有水果氣味。
- c. 腎上腺機能低下的症狀，如嚴重胃部不適或嘔吐、嚴重頭昏或昏厥、肌肉無力、感覺非常疲倦、情緒改變、沒有飢餓感或體重減輕。



1



Triamcinolone (Topical)

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 所有劑型：

- d. 庫興氏病的症狀，如上背部或腹腔處的體重增加、月亮臉、重度頭痛或傷口癒合緩慢。
- e. 用藥處感到刺激。

2. 適用所有皮膚產品：

- a. 皮膚出現改變（青春痘、妊娠紋、傷口癒合緩慢、長毛）。
- b. 皮膚顏色改變。
- c. 皮膚變薄。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 一旦想起應儘快補上錯過的藥劑。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次塗抹兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 所有劑型：

- a. 存放於室溫下。請勿冷凍儲存。
- b. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。
- c. 扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥師諮詢。您所在地區可能有藥物回收計劃。



2

