

# Metronidazole (Topical)

製定日期：102年9月11日  
修定日期：109年7月1日(第4版)

## 一. 此藥有哪些作用？

1. 該藥用於紅斑痤瘡的治療。
2. 此藥用於治療陰道感染。
3. 此藥可能因其他原因而給您服用。



## 二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 飲用酒精或使用含酒精的產品前，請告知您的醫師。服用此藥期間及使用最後一劑藥物後一段時間內，您需要避免飲酒或服用含有酒精成分的產品。
2. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。



懷孕請告訴醫師

## 三. 副作用為何？

1. 可能包括：皮膚乾燥、剝落、瘙癢、灼痛或刺痛、頭痛、胃痛。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

## 四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 一旦想起應儘早服用錯過的藥物。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。



# Metronidazole (Topical)

製定日期：102年9月11日

修定日期：109年7月1日(第4版)

## 四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

3. 請勿在同一時間使用 2 次劑量或額外劑量。

## 五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。請勿冷凍儲存。
2. 防止藥物受熱。
3. 防止藥物變冷。
4. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。
5. 扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥劑師諮詢。

