


Mometasone (Topical)

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥的作用是治療皮膚刺激。
2. 此藥用於治療皮疹。



二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 請勿用於治療尿布性皮炎。
2. 對於接受治療之幼兒，其穿尿布的部位不要給他穿緊身尿布或塑膠長褲。這可確保更多藥液進入體內。
3. 有些藥品可能無法用於尿布區域。請和醫師討論。
4. 在皮膚上使用其他藥物或產品前，請告知您的醫師。
5. 勿塗抹於割傷處、擦傷處或受損的皮膚。
6. 在大片皮膚上塗抹或有裸露傷口時，請務必特別小心。請告知醫師。
7. 使用此藥時，請勿超過醫師指示的時間長度。
8. 服用此藥可能增加罹患白內障或青光眼的機率。請和醫師討論。
9. 不同劑型可能適用於不同年齡的兒童病患。該藥用於兒童之前，請先洽詢醫師。
10. 在某些案例中，此藥會影響兒童和青少年的成長發育。可能需要定期檢查他們的成長發育狀況。
11. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。



懷孕請告訴醫師



1



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-222-04



天成醫療體系 中壢 天晟醫院 楊梅 天成醫院 關心您

Mometasone (Topical)

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 警告/小心：即便極為罕見，有些人服用藥物時可能會有極為嚴重或甚至致死的副作用。若您出現下列可能與極嚴重副作用相關的任何徵兆或症狀，請立即告知您的醫師或接受醫療協助：
 - a. 過敏反應的症狀有皮疹；蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨發燒；喘鳴；胸口或喉嚨緊繃；難以呼吸、吞嚥或說話困難；嗓音異常嘶啞；或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
 - b. 腎上腺機能低下的症狀，如嚴重胃部不適或嘔吐、嚴重頭昏或昏厥、肌肉無力、感覺非常疲倦、情緒改變、沒有飢餓感或體重減輕。
 - c. 庫興氏病的症狀，如上背部或腹腔處的體重增加、月亮臉、重度頭痛或傷口癒合緩慢。
 - d. 高血糖的症狀有意識惑亂、嗜睡、口渴感增強、飢餓、頻尿、潮紅、呼吸急促或呼吸中帶有水果氣味。
 - e. 皮膚出現改變（青春痘、妊娠紋、傷口癒合緩慢、長毛）。
 - f. 用藥處感到刺激。
 - g. 皮膚變薄。
 - h. 視力改變。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 一旦想起應儘快補上錯過的藥劑。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次塗抹兩倍或額外劑量。



Mometasone (Topical)

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。
3. 扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥師諮詢。

