

# Triamcinolone, Neomycin, Gramicidin, and Nystatin

製定日期：102年9月11日

修定日期：109年7月1日(第4版)

## 一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥的作用是治療皮膚刺激。
2. 此藥用於治療皮疹。
3. 用於出現皮膚感染時治療某些皮膚疾病。



## 二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 請勿超過醫師告知您的藥物使用時長。
2. 在大片皮膚上塗抹或有裸露傷口時，請務必特別小心。請告知醫師。
3. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。
4. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。您將必須討論對嬰兒造成的風險。

## 三. 副作用為何？

1. 警告/小心：即便極為罕見，有些人服用藥物時可能會有極為嚴重或甚至致死的副作用。若您出現下列可能與極嚴重副作用相關的任何徵兆或症狀，請立即告知您的醫師或接受醫療協助：
  - a. 過敏反應的症狀有皮疹；蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨發燒；喘鳴；胸口或喉嚨緊繃；難以呼吸、吞嚥或說話困難；嗓音異常嘶啞；或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。



1



Last Reviewed Date  
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-223-04

# Triamcinolone, Neomycin, Gramicidin, and Nystatin

製定日期：102年9月11日

修定日期：109年7月1日(第4版)

## 三. 副作用為何？

- b. 腎上腺機能低下的症狀，如嚴重胃部不適或嘔吐、嚴重頭昏或昏厥、肌肉無力、感覺非常疲倦、情緒改變、沒有飢餓感或體重減輕。
- c. 其它包括：無法排尿或排尿量改變、聽力改變、耳鳴、聽力喪失、感覺極為乏力或虛弱、皮膚或鞏膜黃染、視力改變、用藥處感到刺激、皮膚出現改變（青春痘、妊娠紋、傷口癒合緩慢、長毛）、皮膚顏色改變、皮膚變薄。

## 四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 一旦想起應儘快補上錯過的藥劑。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。

## 五. 切勿一次塗抹兩倍或額外劑量。我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。
3. 扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥師諮詢。

