

Metronidazole and Nystatin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥用於治療陰道感染。

二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 使用此藥期間以及服用最後一劑後的至少 1 天內，請勿飲酒。飲酒或食用含酒精的食品，可能會導致潮紅、嘔吐或心動過速。
2. 此藥可能使一種稱作無菌性腦膜炎的嚴重大腦疾患的風險增高。若您出現頭痛、發燒、畏寒、嚴重腹部不適或嘔吐、頸僵硬、皮疹、對明亮的光線敏感、嗜睡或感到困惑，請立即洽詢您的醫師。
3. 若性夥伴也出現感染徵候，他/她可能也需要接受治療。請洽詢您的醫師。
4. 使用此藥時，請勿沖洗或使用衛生棉條等其他陰道產品。在服用最後一劑藥物後的一段時間內，您需要避免使用這些產品。若您尚有任何疑問，請諮詢您的醫師。
5. 保險套或避孕隔膜可能無法完全避免懷孕。使用此藥期間請採用另一種避孕方法。
6. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。



1



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-215-04

Metronidazole and Nystatin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：味覺異常、噁心或嘔吐、便秘、口乾、無饑餓感、無法入睡。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 請致電您的醫師詢問指示。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 避光。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。
4. 扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥劑師諮詢。

