

# Oxymetazoline (Nasal)

製定日期：102年9月11日  
修定日期：109年7月1日(第4版)

## 一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥的作用是治療鼻塞。
2. 此藥可能因其他原因而給您服用。請洽詢您的醫師。

## 二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 請勿使用超過3天，請洽詢醫師。太常使用此藥或使用時長超過指示期間，可能會導致鼻塞再度發作或惡化。
2. 若要讓6歲以下兒童服用此藥，須先徵詢醫師意見。
3. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。



## 三. 副作用為何？

1. 警告/小心：即便極為罕見，有些人服用藥物時可能會有極為嚴重或甚至致死的副作用。若您出現下列任何徵兆或症狀，請立即告知您的醫師：
  - a. 過敏反應的症狀有皮疹；蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨發燒；喘鳴；胸口或喉嚨緊繃；難以呼吸、吞嚥或說話困難；嗓音異常嘶啞；或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。



# Oxymetazoline (Nasal)

製定日期：102年9月11日  
修定日期：109年7月1日(第4版)

## 三. 副作用為何？

2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

## 四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 假如您定期使用此藥物，一旦錯過使用，請在想起時立即使用。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 請勿在同一時間使用 2 次劑量或額外劑量。
4. 此藥通常僅在需要時才使用。使用次數勿超過醫師囑咐的次數。

## 五. 我應該如何儲存此藥？

1. 於室溫下儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。
3. 扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥師諮詢。

