

Permethrin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥用於治療疥瘡 (scabies)。用於治療疥瘡，疥瘡是人類皮膚感染疥蟲，會在表皮的顆粒層穴居產卵，疥蟲會引起人類的過敏反應，典型疥瘡臨床症狀為極度搔癢、紅斑、丘疹、水泡，甚至會併發細菌感染的風險。
2. 該藥用於虱的治療。
3. 此藥可能因其他原因而給您服用



二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 若沒有事先和醫師確認，**請勿讓2個月以下幼兒使用此藥。**
1. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。

三. 此藥物的其他副作用為何？

1. 可能包括：瘙癢，請諮詢醫師應如何減輕瘙癢、用藥處感到刺激。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。



Permethrin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

四. 使用方法：



指甲的下緣
可能會藏有
疥蟲



洗淨皮膚後
全身擦乾



待體溫下降再
開始抹藥，避
免因體溫高增
加藥物全身性
吸收



注意不要漏掉
指甲內緣、
指縫、耳後、
腋下、肚臍、
生殖器



建議睡前再
塗抹藥品



待8~14小時
後才能將藥
物洗掉



若有需要，醫
師會開立2條
藥膏，第2條
於一周後再使
用一次



兩次療程結
束後請回診
追蹤檢查



Permethrin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

五. 環境處理：

1. 只要有**接觸到患者皮膚**的人均有可能被傳染。
2. 患者的**衣物、床被單、毛巾均必須用 50 °C 以上的水煮或烘乾機烘熱至少 10分鐘**，若無法加熱處理，就用塑膠袋密封置於**室溫至少 72 小時**或是直接丟棄。
3. 患者接觸過的家具建議用吸塵器清潔，或是用含有除蟲菊化合物的水煙式殺蟲劑進行除蟲。

六. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 一旦想起應儘快補上錯過的藥劑。

七. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。將藥物放在兒童無法觸及的地方。

