

Tacrolimus (Topical)

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥用於治療濕疹。
2. 此藥可能因其他原因而給您服用。請洽詢您的醫師。

二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 請勿超過醫師告知您的藥物使用時長。
2. 避免日曬、太陽燈及日曬床。



使用防曬乳液並穿防曬的衣物和太陽眼鏡。

3. 服用此藥時，請勿進行任何類型的光療法。
4. 飲酒前，先洽詢醫師指示。
5. 請遵照醫師指示進行皮膚檢驗。



6. 塗抹此藥的部位產生燒灼感、刺痛感、疼痛或瘙癢是正常的現象。大部分時候，這些現象會在治療前幾天發生，並在皮膚狀況好轉時消退。若任何這些作用非常嚴重、影響了您的正常生活或長時間持續而不消退，請連絡您的醫師。
7. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。

三. 副作用為何？

1. 可能包括：燒灼感、蕁麻疹、皮膚紅腫、頭痛。



1

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-228-04



Tacrolimus (Topical)

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 一旦想起應儘快補上錯過的藥劑。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次塗抹兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 鎖緊上蓋。
3. 儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
4. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。
5. 扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥劑師諮詢。

