

Sulfadiazine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥用於治療或預防細菌感染。

二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 請勿持續使用超過指示期間。可能會發生二次感染。
3. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。請告知醫師。
4. 請遵照醫師指示進行尿樣檢驗。
5. 若您患有蠶豆症（G6PD 缺乏症）(G6PD deficiency)，請小心。可能引起貧血。
6. 此藥可能會使您更容易曬傷。如果您需要暴露在陽光下，請務必特別小心。如果您在服用此藥物期間比較容易曬傷，請告知醫師。
7. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。



三. 副作用為何？

1. 可能包括：頭痛、噁心或嘔吐、腹瀉、無饑餓感、眩暈、無法入睡。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。



Sulfadiazine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
3. 避光。
4. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。
5. 扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥劑師諮詢。

