

Ciprofloxacin (Otic)

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥用於治療耳朵感染。
2. 這用於治療某些耳朵感染且耳內放置導管的患者。


二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 所有劑型：

- a. 告知所有醫療照護提供者您正在服用此藥。這包括您的醫師、護理師、藥師和牙醫師。
- b. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。

2. 滴耳液：

- a. 請勿持續服用超過指示的期間。
可能會發生二次感染。



三. 副作用為何？

1. 滴耳液：

- a. 頭痛。
- b. 瘙癢。
- c. 使用後會有短暫的不適。

2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。



Ciprofloxacin (Otic)

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 滴耳液：

- a. 一旦想起應儘早服用錯過的藥物。
- b. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
- c. 請勿在同一時間使用 2 次劑量或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 所有劑型：

- a. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。
- b. 扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥師諮詢。

2. 滴耳液：

- a. 存放於室溫下。
- b. 將未使用的容器保存在鋁箔袋中直到用時。
- c. 避光。
- d. 給予藥劑後，請丟棄任何剩餘部分。

