

Acyclovir (Topical)

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥用於治療唇泡疹。
2. 此藥用於治療生殖器疣(尖形濕疣)。
3. 該藥用於皰疹感染的治療。



二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 所有劑型：

- a. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。

2. 軟膏：

- a. 此藥並非皰疹感染治療藥物。請洽詢醫師相關事項。
- b. 若您患有生殖器皰疹，此藥將無法抑制其蔓延。當您患有潰瘍或其他生殖器皰疹的徵狀時，應避免任何形式的性行為。若您沒有任何徵狀，生殖器皰疹也可能蔓延。請勿在不使用膠乳或聚氨酯保險套的情形下進行任何形式的性愛。請洽詢您的醫師。

三. 副作用為何？

1. 警告/小心：即便極為罕見，有些人服用藥物時可能會有極為嚴重或甚至致死的副作用。若您出現下列可能與極嚴重副作用相關的任何徵兆或症狀，請立即告知您的醫師或接受醫療協助：

- a. 過敏反應的症狀有皮疹；蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨發燒；喘鳴；胸口或喉嚨緊繃；難以呼吸、吞嚥或說話困難；嗓音異常嘶啞；或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。



1

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-240-04



Acyclovir (Topical)

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 一旦想起應儘快補上錯過的藥劑。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次塗抹兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 所有劑型：
 - a. 存放於室溫下。請勿冷凍儲存。
 - b. 防止藥物受熱。
 - c. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。
 - d. 扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥劑師諮詢。

