Allopurinol

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於降低血液中的尿酸。
2. 此藥用於預防接受化療期間的尿酸偏高。
3. 此藥可能因其他原因而給您服用。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。請告知醫師。
2. 遵照醫師建議的飲食和運動計畫。
3. 可能需要數週才能完全見效。
4. 在您開始服用此藥數個月內，痛風發作的機會會提高。 請勿停用此藥。 可能會給予您其他藥物來協助您避免痛風發作。 請向您的醫師洽詢。
5. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
6. 曾經發生嚴重且有時致命的反應。多數情形下，這類不良反應包括（例如）發燒樣徵候、皮疹或腺體腫大，並伴發身體多處器官（如肝臟、腎臟、血液、心臟、肌肉及關節或肺部）疾患。若您有任何疑問，請告知醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-308-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Allopurinol

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

7. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。 您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。
8. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。 您將必須討論對嬰兒造成的風險。

三. 副作用為何？

1. 可能包括：腹瀉、噁心。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
2. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫乾燥處。 不要儲存在浴室。
2. 保護藥錠免受光線照射。
3. 將藥物放在兒童無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-308-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您