Amlodipine

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)

- 一. 此藥有哪些作用?
 - 1. 此藥用於治療高血壓。
 - 2. 此藥用於治療某些類型的胸痛(心絞痛)。
- 二. 使用此藥必須注意哪些事項?
 - 在您明白該藥物對您的影響之前, 應避免駕駛、進行其他需要您提 高警覺性的工作或活動。



- 2. 為降低頭暈或昏厥的機率,若您已坐下或躺下一段時間,應非常緩慢地站起。 上下樓梯時請小心。
- 3. 請遵照指示檢查您的血壓。
- 4. 雖然比較罕見,但在初次使用此藥或增大此藥劑量時,可能出現胸痛加劇和心臟病發作風險
- 5. 在使用可能引起血壓升高的非處方藥前,先洽詢醫師。包括咳嗽或感冒藥、減肥藥、興奮劑、布洛芬(Ibuprofen)或類似的止痛藥。
- 6. 使用此藥後曾出現肝臟疾患的病例發生。有時需要 住院治療肝臟疾病。請諮詢醫師。
- 7. 若你是 65 歲或 65 歲以上,使用此藥時要小心。你可能會有較多的副作用。

T-C-0210-ED-313-04

Last Reviewed Date 2020-03-03 UpToDate



Amlodipine

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

8. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養,請告知醫師。若突然胸痛,請勿用此藥來治療。 這沒有幫助。 請與您的醫師洽談。

三. 副作用為何?

- 1. 可能包括: 感覺頭暈、想睡、疲倦或虛弱、臉潮紅、 噁心、胃痛。
- 2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問,請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。
- 四. 如果我忘記(錯過)一次用藥,該怎麼辦?
 - 1. 儘早把忘記用的藥用了。
 - 2. 若漏服藥物12小時或更長時間,則跳過漏服的劑量, 仍然按正常時間表服藥。
 - 3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。
- 五. 我應該如何儲存此藥?
 - 1. 防止藥物受熱及暴露於光線下。並儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
 - 2. 將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。



T-C-0210-ED-313-04

Last Reviewed Date 2020-03-03 UpToDate

