Aripiprazole

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥的作用是治療精神分裂症。
2. 該藥用於治療雙相障礙。
3. 此藥的作用是治療抑鬱症。
4. 用於治療自閉症患者的某些行為問題。
5. 該藥用於抽動穢語綜合症的治療。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動，直到您發現該藥的影響。
2. 為降低頭暈或昏厥的機率，若您已坐下或躺下一段時間，應非常緩慢地站起。上下樓梯時請小心。
3. 若您患有苯酮尿症 (PKU)，請告知您的醫生。某些藥品含有苯丙胺酸 (phenylalanine)。
4. 如果您不能分解蔗糖或果糖，請告知醫師。某些產品中含有蔗糖或果糖。
5. 服用此藥時避免飲酒。
6. 於高熱天氣或動態活動時，請務必小心。 喝大量的水以防止脫水。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-319-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Aripiprazole

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

7. 抽搐的風險可能增加。請洽詢醫師。
8. 服用此藥曾出現白血球計數偏低的問題。這可能會導致感染的機率升高。若您出現感染徵候，例如發燒、發冷或喉嚨痛，請立即致電聯絡您的醫師。
9. 曾發生使用此類藥物後出現高血糖症或糖尿病、高膽固醇與體重增加的案例。這些可能會提高心臟與腦血管疾病的機率。
10. 請遵照醫師指示檢查您的血糖。
11. 使用此藥時可能會感到頭暈、嗜睡或平衡感變差。這些症狀可能會導致跌倒，從而導致骨折或其他健康問題。

12. 患癡呆症的老年成人使用類似此藥的藥物後，有出現中風次數增多的病例發生。有時，這類副作用可能危及生命。此藥尚未獲准用於治療因癡呆症引起的精神疾患。
13. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。 您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。
14. 若於懷孕後期服用此藥，可能會導致新生兒出現無法控制的肌肉活動和戒斷症狀。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-319-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Aripiprazole

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：感覺頭暈、想睡、疲倦或虛弱、心神不定、焦慮、頭痛、噁心或嘔吐、體重增加、便秘、入睡困難、不明原因的食慾改變、鼻或咽喉刺激、口乾、顫抖、流口水、鼻子不通氣、 。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-319-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您