Mesalamine

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

- 1. 此藥用於治療潰瘍性大腸炎。
- 2. 此藥用於預防潰瘍性大(結)腸炎覆發。
- 3. 此藥用於治療結腸(大腸)末端處的輕度至中度疾病。
- 4. 此藥可能因其他原因而給您服用。請洽詢您的醫師。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?


- 1. 若您對亞硫酸鹽過敏,請洽詢醫師。某些藥品的確含 有亞硫酸鹽。
- 2. 若您患有苯酮尿症 (PKU), 請告知您的醫生。某些藥 品含有苯丙胺酸 (phenylalanine)。
- 3. 由於有引起雷氏症候群 (Reye's syndrome) 的風險, 勿讓患有流感、水痘或其他病毒感染或癥狀正好轉的 孩童和青少年服用此藥。 雷氏症候群可引起大腦和 肝臟出現嚴重問題。
- 4. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養,請告知醫師。 您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處 與風險。



懷孕請告訴醫師



T-C-0210-ED-320-04





Mesalamine

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何?

- 1. 可能包括:便秘、腹瀉、胃痛、胃部不適或嘔吐、 胃灼熱、打嗝、鼻或咽喉刺激、頭昏或頭痛、背痛、 咳嗽。
- 2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問,請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。
- 四. 如果我忘記(錯過)一次用藥,該怎麼辦?
 - 1. 儘早把忘記用的藥用了。
 - 2. 如已接近下一次用藥時間,則跳過錯過的那次用藥量,隨後回到正常用藥時間。
 - 3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。
- 五. 我應該如何儲存此藥?
 - 1. 於室溫下儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
 - 2. 將所有藥物放在一個安全位置。將藥物放在兒童無 法觸及的地方。



T-C-0210-ED-320-04

Last Reviewed Date 2020-03-03 UpToDate

