Bisoprolol

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療高血壓。
2. 此藥可能因其他原因而給您服用。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
2. 為降低頭暈或昏厥的機率，若您已坐下或躺下一段時間，應非常緩慢地站起。上下樓梯時請小心。
3. 按照醫囑檢查血壓和心率。
4. 此藥可能會隱藏低血糖症狀。請與醫師洽談。
5. 若您患高血糖（糖尿病），將需密切觀察您的血糖變化。



6. 使用可能升高血壓的非處方藥前請洽詢醫師。這包括咳嗽或感冒藥、減肥藥、興奮劑、布洛芬或類似的藥品、某種天然製品或補充劑。
7. 請勿突然停藥。若停藥，胸口會比以往疼痛，有時甚至會引發心臟病。 若您有心臟方面的疾病，風險可能會更高。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-345-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Bisoprolol

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

8. 此藥物讓您難以判別是否出現甲狀腺功能亢進的症狀，如心動過速。若您有甲狀腺亢進的問題卻突然停藥，病情可能會加劇、甚至可能危及生命請洽詢醫師建議。
9. 若您曾經出現嚴重的過敏反應，請告知您的醫師。若是您接觸過敏源，有可能引發更加嚴重的反應。若您使用 epinephrine（腎上腺素）來治療嚴重的過敏反應，請和醫師洽談。當您正在使用此藥時，epinephrine（腎上腺素）可能無法充分發揮藥效。
10. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。



三. 副作用為何？

1. 可能包括：頭痛、感覺疲倦或虛弱、普通感冒徵候。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-345-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Bisoprolol

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-345-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您