Calcitriol

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於控制某些病患的低血鈣水平。
2. 此藥用於治療某些病患副甲狀腺素（副甲狀腺荷爾蒙）含量偏高的情形。
3. 此藥可能因其他原因而給您服用。

維他命D

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。請告知醫師。
2. 請向您的醫師洽詢服用此藥時是否需要與鈣補充劑併用。
3. 體內維他命 D 過多可能會導致問題。此藥的量不可超過醫師指示的劑量。確保您知道體內維他命 D 過多的症狀。若您尚有任何疑問，請告知醫師。
4. 若您正從其他來源攝取維生素D，請洽詢醫師。
5. 若您目前也在使用含鎂的藥品，請告知您的醫師。這包括某些類型的制酸劑。
6. 請告知您的醫師，瞭解在服用此藥時您是否需要增加飲水量。
7. 遵照醫師建議的飲食計畫。
8. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。 您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-363-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Calcitriol

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能發生高血鈣症、高尿鈣症。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 避光。
3. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
4. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-363-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您