Canagliflozin

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

- 1. 此藥的作用是減低糖尿病患者的血糖含量。
- 2. 此藥用於降低心臟病發作、中風或腎臟疾病惡化、 因心臟衰竭而須就醫以及造成死亡的機率。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

- 1. 若您的血糖一直偏低,請勿開車。 否則發生意外的危險性會增加。
- 2. 請遵照醫師指示檢查您的血糖。
- 3. 為降低頭暈或昏厥的機率,若您已坐下或躺下一 段時間,應非常緩慢地站起。上下樓梯時請小心。
- 4. 於高熱天氣或動態活動時,請務必小心。 喝大量 的水以防止脫水。
- 5. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。請告知醫師。
- 6. 若您無法正常進食或飲水,請洽詢醫師。這包括 您感到不適、禁止飲食或您正在進行某些手術。
- 7. 若您無法透過嘴巴喝飲料或感覺胃部不適、嘔吐或持續不斷的腹瀉,您須避免脫水。脫水可能會引發新的腎臟問題或加劇。





T-C-0210-ED-364-04

Last Reviewed Date 2020-03-03 UpToDate





Canagliflozin

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

- 8. 曾發生血酸或尿酸濃度過高(酮酸中毒(酮酸症)) 以及嚴重的泌尿道感染(UTI)。酮酸中毒可能會致 命。這兩種情況都可能需要住院接受治療。
- 9. 在經歷發燒、感染、受傷或進行手術等對身體造成 負擔的情形時,可能更難以控制血糖。身體活動、 運動或餐食改變可能也會影響血糖。
- 10.曾出現腎臟疾病。有時可能需要住院或透過透析治療腎臟疾病。
- 11.如果您在懷孕時服用此藥物,可能會傷害腹中胎兒。若在服用此藥期間您懷孕或試圖懷孕,應立即致電醫師商洽。
- 12.使用此類藥物曾出現一種罕見的重度感染。這種感染可能是致命的。若您的生殖器或您的生殖器和直腸之間的區域變得觸痛、發紅或腫脹,並且您出現發燒或感覺不適,請立即尋求醫療協助。
- 13.此藥可能增大骨折風險。 請與醫師商洽相關事項。







T-C-0210-ED-364-04

Last Reviewed Date 2020-03-03 UpToDate



Canagliflozin

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何?

- 1. 可能發生低血糖(當與SU或胰島素併用)、生殖器感染、尿路感染。
- 2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作 用有疑問,請聯絡您的醫師。
- 四. 如果我忘記(錯過)一次用藥,該怎麼辦?
 - 1. 儘早把忘記用的藥用了。
 - 2. 如已接近下一次用藥時間,則跳過錯過的那次用藥量,隨後回到正常用藥時間。
 - 3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。
- 五. 我應該如何儲存此藥?
 - 1. 於室溫下儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
 - 2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒 童無法觸及的地方。



T-C-0210-ED-364-04



