Cilostazol

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

- 1. 此藥用於減輕腿部疼痛、麻木和刺痛感。
- 2. 此藥可能因其他原因而給您服用。請洽詢您的醫師。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

- 1. 可能需要數週才能完全見效。
- 2. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。
- 3. 您可能會更容易出血。小心避免受 傷。使用軟毛牙刷和電動剃鬚刀。



- 4. 若您時常喝葡萄柚汁或吃葡萄柚,請告知您的醫師。
- 5. 若您已懷孕或計畫懷孕,請告知醫師。您將必須討 論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。

三. 副作用為何?

- 1. 出血症狀,如嘔血或咳血;似咖啡渣的嘔吐物;血尿;黑色、紅色或黑便;牙龈出血;陰道異常出血; 無理由出現瘀傷或瘀傷變大;或者無法止住的出血。
- 2. 其它包括:胸痛或胸悶或心動過速、心跳異常、嚴 重眩暈或失去知覺、手臂或腿的水腫。



T-C-0210-ED-375-04

Last Reviewed Date 2020-03-03 UpToDate



Cilostazol

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何?

- 3. 服用此藥極少出現白血球計數減少反應。這可能會 導致受感染的機率升高。若您曾有白血球計數偏低 的問題,請告知您的醫師。若您出現感染徵候,例 如發燒、發冷或喉嚨痛,應立即致電醫師求助。
- 4. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。
- 四. 如果我忘記(錯過)一次用藥,該怎麼辦?
 - 1. 儘早把忘記用的藥用了。
 - 2. 如已接近下一次用藥時間,則跳過錯過的那次用藥量,隨後回到正常用藥時間。
 - 3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。
- 五. 我應該如何儲存此藥?
 - 1. 存放於室溫下。
 - 2. 儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
 - 3. 將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。



T-C-0210-ED-375-04



