Ciprofloxacin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?



1. 此藥用於治療或預防細菌感染。

二. 使用此藥必須注意哪些事項

1. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
2. 若您使用此藥已有較長時間，請做血液檢驗。請洽詢醫師。
3. 若您有高血糖或低血糖的症狀，如呼吸中帶有水果請勿持續服用超過指示期間。可能會發生二次感染。
4. 若您服用含有咖啡因的藥物，或食用或飲用含咖啡因的產品（如茶、咖啡、可樂或巧克力），請告知您的醫師。
5. 氣味、頭昏、呼吸急促、心動過速、意識惑亂、嗜睡、感覺虛弱無力、潮紅、頭痛、口渴感或飢餓感增強、頻尿、顫慄或出汗等，請告知您的醫師。
6. 使用此類藥物曾出現高血糖和低血糖的情形。大多數時候，服用降低血糖的藥物（如胰島素）的糖尿病病患出現了低血糖。嚴重低血糖導致昏迷，有時甚至導致死亡。請遵照醫師指示檢查血糖。



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-376-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Ciprofloxacin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

7. 你很容易曬傷。避免陽光、太陽燈和日曬床照曬。使用防曬乳液；穿防曬的衣物和太陽眼鏡。
8. 曾經發生使用此藥後出現嚴重且有時致命的過敏反應，但很罕見。 請與您的醫師洽談。
9. 很少有服用此藥後出現嚴重且有時致命的作用。包括肌肉或關節、腎臟、肝臟、血液或其他問題。若您尚有任何疑問，請洽詢醫師。
10. 若出現肝臟問題徵候，請立即致電醫師求助；這類徵候包括像是尿液暗色、疲倦、無飢餓感、胃部不適或胃痛、大便淡色、嘔吐，或者皮膚或眼睛泛黃。
11. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。 您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。
12. 曾在使用此藥後出現某一類型的心跳異常（QT 間期延長）。若有心跳過速、心跳異常現象，或者若您暈厥，請立即聯絡醫師。
13. 用於 18 歲以下少年及幼童時，請務必特別小心。請洽詢醫師

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-376-04

Ciprofloxacin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：腹瀉、胃部不適或嘔吐、頭痛。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 於室溫下儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-376-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您