Dabigatran

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療或避免血液凝塊。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 在進行某些手術前，需按照醫囑停用此藥。如果此藥被停用，您的醫師將在您手術後告訴您何時再次使用此藥。
2. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。請告知醫師。



3. 您會更容易出現出血。請格外小心且避免受傷。使用軟毛牙刷和電動刮鬍刀。在極罕見情況下，有些出血問題會使人致命。
4. 若您跌倒或不慎受傷，或者撞到頭部，請立即聯絡您的醫師。即使您感覺無恙，也請洽詢醫師建議。
5. 若在服用此藥期間您懷孕或試圖懷孕，應立即致電醫師商洽。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-401-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Dabigatran

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：噁心、胃痛或胃灼熱。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 若距離下一次用藥時間不到 6 小時，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 於室溫下儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 4個月後丟棄瓶中所有未服用的膠囊。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-401-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您