Desmopressin

製定日期:102年9月11日

修定日期:110年1月8日(第5版)

一. 此藥有哪些作用?

- 1. 此藥用於預防尿床。
- 2. 此藥用於治療稱為夜間多尿症的問題,該問題導致 您必須在晚上醒來排尿。
- 3. 該藥用於治療尿崩症。
- 4. 該藥用於血友病的治療。
- 5. 該藥用於血管性血友病病的治療。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

- 1. 曾經發生使用此藥後出現嚴重的過敏反應,但很罕見。注射此藥有時會發生可能致命的過敏反應。請 洽詢您的醫師。
- 2. 若您正以母乳餵哺幼兒,請告知醫師。您將必須討論對嬰兒造成的風險。
- 3. 用於兒童時須小心。 請與醫師商洽相關事項。

三. 副作用為何?

- 1. 臉潮紅。
- 2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作 用有疑問,請聯絡您的醫師。



T-C-0210-ED-421-04





Desmopressin

四.使用方法:

製定日期:102年9月11日 修定日期:110年1月8日(第5版)

- 1. 沿著印有箭頭指示的邊角剝開箔紙,輕輕推出藥片。
- 2. 把藥片放在舌下含服,約數秒鐘即溶,不需喝水。











- 五. 如果我忘記(錯過)一次用藥,該怎麼辦?
 - 1. 儘早服藥,如已接近下一次用藥時間則跳過。
 - 2. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。
- 六. 我應該如何儲存此藥?
 - 1. 放於室溫下防止藥物受熱及暴露於光線下。
 - 2. 儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。



T-C-0210-ED-421-04

Last Reviewed Date 2020-03-03 UpToDate

