Acetazolamide

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於排出體內多餘液體。
2. 此藥用於治療或預防高空症。
3. 此藥用於協助控制一些特定類型的癲癇發作。
4. 此藥用於治療青光眼。
5. 此藥可能因其他原因而給您服用。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動，直到您發現該藥的影響。
2. 若您使用此藥治療青光眼，請定期檢查眼壓。請洽詢醫師。

4. 若您患糖尿病，將需密切觀察您的血糖變化。
5. 若您有高血糖或低血糖的症狀，如呼吸中帶有水果氣味、頭昏、呼吸急促、心動過速、意識惑亂、嗜睡、感覺虛弱無力、潮紅、頭痛、口渴感或飢餓感增強、頻尿、顫慄或出汗等，請告知您的醫師。
6. 此藥會影響兒童和青少年的成長發育。 可能需要定期檢查他們的成長發育狀況．





Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-407-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Acetazolamide

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

7. 若您也在服用 aspirin（阿斯匹靈），請告知您的醫師。併服高劑量 aspirin和此藥的病患，出現失去飢餓感、呼吸急促、遲鈍、昏迷和死亡的情形。
8. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。
9. 此藥可能會使您更容易曬傷。如果您需要暴露在陽光下，請務必特別小心。如果您在服用此藥物期間比較容易曬傷，請告知醫師。

三. 副作用為何？

1. 可能包括：噁心或嘔吐、味覺能力的改變、腹瀉、無饑餓感、視力模糊、感覺頭暈、想睡、疲倦或虛弱、頭痛、臉潮紅、感覺緊張、容易興奮。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
2. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-407-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Acetazolamide

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 於室溫下儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-407-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您