Doxazosin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療高血壓。
2. 對於男性，此藥用來治療攝護腺肥大癥狀。
3. 此藥可能因其他原因而給您服用。請洽詢您的醫師。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 為降低頭暈或昏厥的機率，若您已坐下或躺下一段時間，應非常緩慢地站起。上下樓梯時請小心。

2. 請遵照指示檢查您的血壓。
3. 若您正要接受白內障手術或其他眼部手術，請與醫師商洽因應對策。

1. 若服用此藥治療攝護腺肥大，請遵照醫師指示做一次直腸指診（檢查護攝腺）和血液檢驗（攝護腺特異抗原檢查）。
2. 若您正服用此藥並有高血壓，在使用可能引起血壓升高的非處方藥前，先洽詢醫師。這些藥包括咳嗽或感冒藥、減肥藥、興奮劑、布洛芬 (Ibuprofen) 或類似的止痛藥、某些天然草藥或補充劑等。
3. 如果您已 70 歲或以上，需謹慎使用此藥。您可能會出現更多副作用。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-415-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Doxazosin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

7. 在接受第一劑後的 24 小時內，請勿駕駛或進行需要保持警覺的事情。在增加劑量，及在停藥後重新開始服藥時，也請避免進行這些事情。在駕駛或進行其他事情前，務必知悉此藥對您的影響。
8. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。

● 長效緩釋藥錠：

1. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
2. 您的糞便中可能會殘留類似藥錠的東西。這是正常現象，無需擔憂。若您尚有任何疑問，請洽詢醫師。
3. 此藥未獲得批准用於婦女。若您是使用此藥的女性，且您已懷孕、計畫懷孕或正在以母乳餵養幼兒，請告知醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-415-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Doxazosin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 感覺頭暈、想睡、疲倦或虛弱、頭痛。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。
4. 若您連續數日忘記服用此藥物，請在您重新開始服用前告知醫師。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-415-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您