Bisacodyl

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療便秘。
2. 此藥用作輕瀉劑，清洗大腸以接受檢查。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 除非有醫務人員的指示，否則請勿使用該藥超過1週或，使用其他瀉劑或軟便劑。
2. 若服用此藥後，出現直腸出血或未排便的情形，請告知您的醫師。
3. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師，您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。
4. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。

三. 副作用為何？

1. 過敏反應的症狀有皮疹；蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨發燒；喘鳴；胸口或喉嚨緊繃；難以呼吸、吞嚥或說話困難；嗓音異常嘶啞；或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-418-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Bisacodyl

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

2. 所有劑型：
   a. 腹痛。
   b. 胃痙攣。
3. 所有直腸藥品：
   a. 燒灼感。
4. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 假如您定期服用此藥物，錯過服用時請在想起時立即服用。如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
2. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。
3. 該藥可使用數次，需要時即可使用。 服用次數勿超過醫師囑咐的次數。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 室溫乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將藥物放在兒童無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-418-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您