Dutasteride

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 對於男性，此藥用來治療攝護腺肥大癥狀。
2. 此藥可能因其他原因而給您服用。請洽詢您的醫師。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 做直腸檢查（檢查前列腺）和血液檢查（PSA 檢查）。請洽詢醫師。
2. 使用此藥期間或停藥後 6 個月內不要捐血。
3. 服用類似此藥的一些男性比其他未使用藥物的男性更容易出現非常嚴重的前列腺癌。而一些使用此藥的男性出現前列腺癌的機率較低。請洽詢您的醫師。
4. 此藥物可能影響男性的精子。這是否會影響生育能力仍有待查證。
5. 懷孕婦女或育齡婦女不得接觸膠囊。請告知醫師。
6. 如果已懷孕或可能懷孕的女性觸碰到藥物洩漏的膠囊，應立即使用肥皂與清水清洗觸碰到的區域。 請立即告知您的醫師。



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-420-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Dutasteride

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 眩暈。
2. 此藥可能引起男性性能力改變或降低性慾。這種狀況在您停用此藥後可能持續。如果這些副作用持續或困擾您，請告知您的醫師。
3. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 一旦想起忘記服用的藥物，請在同一天儘早服用。
2. 若您直到第二天才想起錯過一次用藥，則跳過該次錯過的用藥量（不再補服），之後回到正常用藥時間。
3. 每日用量不可服用 2 劑。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 於室溫下儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-420-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您