Sacubitril and Valsartan

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於降低因心臟衰竭死亡的風險。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

- 1. 請遵照指示檢查您的血壓。
- 2. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。請告知醫師。
- 3. 若您正在使用含鉀的鹽替代品、留鉀性利尿劑或鉀 補充劑,請告知您的醫師。
- 4. 於高熱天氣或動態活動時,請務必小心。 喝大量 的水以防止脫水。
- 5. 若您過度排汗、體液流失、嘔吐或稀便,請告知您 的醫師。這可能會導致低血壓。
- 6. 曾經發生稱作血管性水腫的嚴重且有時致命的反應。 黑人病患出現血管性水腫的機率可能較高。
- 7. 在您明白該藥物對您的影響之前,應避免駕駛、進 行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
- 8. 為降低頭暈或昏厥的機率,若您已坐下或躺下一段時間,應非常緩慢地站起。上下樓梯時請小心。







T-C-0210-ED-447-04

Last Reviewed Date 2020-03-03 UpToDate



Sacubitril and Valsartan

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何?

- 1. 可能包括:低血壓、高血鉀、咳嗽、眩暈、血管性 水腫、紅疹、蕁麻疹等。
- 2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副 作用有疑問,請聯絡您的醫師。
- 四. 如果我忘記(錯過)一次用藥,該怎麼辦?
 - 1. 儘早把忘記用的藥用了。
 - 如已接近下一次用藥時間,則跳過錯過的那次用藥量,隨後回到正常用藥時間。
 - 3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。
- 五. 我應該如何儲存此藥?
 - 1. 於室溫下儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
 - 2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒 童和寵物都無法觸及的地方。



T-C-0210-ED-447-04



