Escitalopram

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥的作用是治療抑鬱症。
2. 此藥的作用是治療焦慮症。
3. 此藥可能因其他原因而給您服用。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
2. 此藥可能增大出血風險。
   有時出血可能危及生命。
3. 服用此藥時避免飲酒。

4. 您若需停用此藥物，應該按醫師囑咐緩慢停用，不然可能會有較高的副作用發作風險。
5. 患憂鬱症時，開始此藥後，睡眠和食慾可能會迅速改善。其他情緒低落的症狀可能需要 4 週才會改善。
6. 一些病患在接受此藥後出現眼部疾患的機率可能會增高。若您出現眼睛疼痛、視力發生變化、或眼睛內部或週圍腫脹或發紅，應立即致電醫師求助。
7. 此藥可能造成低血鈉。過低的血鈉可能會危及生命，導致癲癇發作、暈倒、呼吸困難或死亡。



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-449-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Escitalopram

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

8. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。
9. 於懷孕第三孕期（末期）服用此藥，可能會導致新生兒發生某些健康問題。請洽詢您的醫師。

三. 副作用為何？

1. 感覺頭暈、想睡、疲倦或虛弱、噁心、腹瀉或便秘口乾、入睡困難、出汗過多、流感樣症狀、流鼻水、頭痛、哈欠。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 於室溫下儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-449-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您