Amlodipine and Valsartan

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療高血壓。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
2. 為降低頭暈或昏厥的機率，若您已坐下或躺下一段時間，應非常緩慢地站起。上下樓梯時請小心。

3. 請遵照指示檢查您的血壓。
4. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。請告知醫師。
5. 使用可能升高血壓的非處方藥前請洽詢醫師。這包括咳嗽或感冒藥、減肥藥、興奮劑、布洛芬或類似的藥品、某種天然製品或補充劑。
6. 若您正在使用含鉀的鹽替代品、留鉀性利尿劑或鉀補充劑，或者低鹽或無鹽餐，請告知您的醫師。
7. 雖然比較罕見，但在初次使用此藥或增大此藥劑量時，可能出現胸痛加劇和心臟病發作風險。 對於患有重度心血管疾病的病患，此風險會更高。 請與醫師商洽相關事項。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-452-04

Amlodipine and Valsartan

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

8. 可能需要數週才能充分顯現療效。
9. 於高熱天氣或動態活動時，請務必小心。喝大量的水以防止脫水。
10. 若您過度排汗、體液流失、嘔吐或稀便，請告知您的醫師。 這可能會導致低血壓。
11. 使用此藥後曾出現肝臟疾患的病例發生。有時需要住院治療肝臟疾病。請諮詢醫師。

三. 副作用為何？

1. 可能包括：眩暈、鼻或咽喉刺激、普通感冒徵候。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將藥物放在兒童無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-452-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您