Ezetimibe and Simvastatin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於減少有害膽固醇並提升有益膽固醇 (HDL)。
2. 此藥用於減少三酸甘油酯。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?



1. 若您患糖尿病，將需密切觀察您的血糖變化。
2. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。
3. 遵照醫師建議的飲食和運動計畫。
4. 服用此藥物前 4 小時內或服用後 2 小時期間內，請勿服用 colestipol（膽利泊）、*cholestyramine*（消膽胺）或 colesevelam（考來維侖）。

1. 避免或限制飲酒量，一天不可超過 3 杯。飲酒過量可能增加罹患肝臟疾病的危險。
6. 勿吃葡萄柚或喝葡萄柚汁。
7. 您可能會有較高的肌肉問題風險。
8. 如果您在懷孕時服用此藥物，可能會傷害腹中胎兒。若在服用此藥期間您懷孕或試圖懷孕，應立即致電醫師商洽。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-453-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Ezetimibe and Simvastatin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：頭痛、普通感冒徵候、腹瀉。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 跳過未服的藥物，繼續按照您的療程服藥。
2. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 鎖緊上蓋。
3. 避光。
4. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
5. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-453-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您