## **Famciclovir**

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)

## 一. 此藥有哪些作用?

- 1. 此藥用於治療或預防皰疹感染。
- 2. 此藥用於治療唇泡疹。
- 3. 該藥用於治療帶狀皰疹。
- 4. 此藥可能因其他原因而給您服用。



# 二. 使用此藥必須注意哪些事項?

- 1. 在您明白該藥物對您的影響之前,應避免駕駛、進 行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
- 2. 若您服用此藥治療唇泡疹,唇泡疹將無法治癒。 請 向您的醫師洽詢。
- 3. 此藥並非皰疹感染治療藥物。請洽詢醫師相關事項。
- 4. 若您患有生殖器皰疹,此藥將無法抑制其蔓延。當您患有潰瘍或其他生殖器皰疹的徵狀時,應避免任何形式的性行為。若您沒有任何徵狀,生殖器皰疹也可能蔓延。請勿在不使用膠乳或聚氨酯保險套的情形下進行任何形式的性愛。請洽詢您的醫師。
- 若您已懷孕或計畫懷孕,若正以母乳餵哺幼兒,請告知醫師。







T-C-0210-ED-482-04

**Last Reviewed Date** 2020-03-03 UpToDate



## **Famciclovir**

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)

## 三. 副作用為何?

- 1. 可能包括:頭痛、噁心、腹瀉、胃痛、經痛。
- 2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問,請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。
- 四. 如果我忘記(錯過)一次用藥,該怎麼辦?
  - 1. 儘早把忘記用的藥用了。
  - 2. 如已接近下一次用藥時間,則跳過錯過的那次用藥量,隨後回到正常用藥時間。
  - 3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。
- 五.我應該如何儲存此藥?
  - 1. 存放於室溫下。
  - 2. 儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
  - 3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒 童和寵物都無法觸及的地方。



T-C-0210-ED-482-04



