Febuxostat

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於降低痛風患者血液中的尿酸。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。請告知醫師。
2. 在您開始首次服用此藥後，痛風發作的次數會更多。請勿停用此藥。可能會給予您其他藥物來協助您避免這些痛風發作情形。請洽詢您的醫師。
3. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。
4. 曾經發生嚴重且有時致命的反應。多數情形下，這類不良反應包括（例如）發燒樣徵候、皮疹或腺體腫大，並伴發身體多處器官（如肝臟、腎臟、血液、心臟、肌肉及關節或肺部）疾患。若您有任何疑問，請告知醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-483-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Febuxostat

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能發生：關節痛、噁心
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 避光。儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-483-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您